


基腐病以外のさつまいもの腐敗に注意！

- 近年、一部のほ場で基腐病以外のさつまいもの腐敗の発生が見られます。
- 腐敗の要因は、従来のフザリウム属菌や細菌が、害虫による根の傷口等から侵入・感染したことによります。
- 植付前に、土壤中の害虫（コガネムシ、ハリガネムシ、センチュウ等）を防除し、食害を防ぎましょう。
- 基腐病対策と同様に、排水対策も重要です。枕畝の除去や排水溝の設置などに取り組みましょう。

害虫の被害



これらの虫害の傷から細菌等が感染

腐敗



【害虫対策のさつまいも適用農薬一覧】

害虫	農薬名	10a使用量	使用時期	使用方法	使用回数
ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	ネマクリーン粒剤	20kg	植付前	全面土壌混和	1回
	ビーラム粒剤	20kg	植付前	全面土壌混和	1回
	ネマトリンエース粒剤	20～30kg	植付前	全面土壌混和	1回
コガネムシ類	ダントツ粒剤	6～9kg	植付前	全面処理土壌混和又は 作条処理土壌混和	1回
ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ コガネムシ類	ビーラムプラス粒剤	20kg	植付前	全面土壌混和	1回
コガネムシ類 ハリガネムシ類	プリンスバイト	6kg	植付前又は 植付時	全面処理土壌混和又は 植溝処理土壌混和	1回

※適用農薬の一部を記載しています。

防除時期・方法等については、お近くの県地域振興局・支庁農政普及課にお問い合わせください。